

Dit is de behandeling bij de ziekte van Von Willebrand



Factortherapie

Bij factortherapie wordt de stollingsfactor die je tekortkomt (of die ontbreekt) toegediend.


- Het verhoogt tijdelijk het factorniveau.
- Om bloedingen te voorkomen (profylaxe) of te behandelen (on demand).
- **Toediening:** injectie in de ader (intraveneus).

DDAVP

Desmopressine (ook wel DDAVP) is een lichaamseigen hormoon.

- De eigen voorraad Von Willebrandfactor die nog aanwezig is in de cellen van de bloedvatwand komt vrij.
- Om bloedingen te voorkomen (profylaxe) en te behandelen (on demand).
- **Toediening:** infuus (injectie in de ader), injectie onder de huid (subcutaan) of als neusspray voor thuisgebruik.

Let op: DDAVP is niet bij ieder type geschikt.



Tranexaminezuur

Tranexaminezuur voorkomt dat bloedstolsels te snel oplossen. Het beschadigde bloedvat krijgt zo beter de kans om te genezen.

- Het werkt vooral goed bij slijmvliesbloedingen.
- Om bloedingen te voorkomen (profylaxe) of te behandelen (on demand).
- **Toediening:** tabletten, mondspoeling of mondspoeling als drank.

Dit is de behandeling bij de ziekte van Von Willebrand

Voor de ziekte van Von Willebrand zijn verschillende behandelopties. Welke behandeling geschikt is voor jou, hangt onder meer af van je type en het risico op (spontane) bloedingen. Je behandelaar kan je informeren over de verschillende geschikte behandelopties.

1. **Factortherapie**

Bij factortherapie wordt de stollingsfactor die je tekortkomt (of die ontbreekt) met een injectie in de ader gebracht. Bij Von Willebrand is dit de Von Willebrandfactor en eventueel factor 8 omdat deze soms ook verlaagd is. De Von Willebrandfactor zorgt namelijk ook voor het transport van factor 8. De behandeling verhoogt tijdelijk het factorniveau. De behandeling wordt gegeven om bloedingen te voorkomen (profylaxe) of om deze te behandelen (on demand).

Toediening: injectie in de ader (intraveneus).

2. **DDAVP**

Desmopressine (ook wel DDAVP) is een lichaamseigen hormoon en wordt gebruikt om bloedingen te voorkomen en te behandelen. Bijvoorbeeld voor een operatie, tandheelkundige ingreep en soms bij hevig menstrueel bloedverlies. Het verhoogt de hoeveelheid Von Willebrandfactor en Factor 8 in het bloed. Het maakt daarbij gebruik van de eigen voorraad die nog aanwezig is in de cellen van de bloedvatwand.

Toediening: infuus (injectie in de ader), injectie onder de huid (subcutaan) of als neusspray voor thuisgebruik.

DDAVP is geschikt bij mensen met de ziekte van Von Willebrand type 1 en soms bij type 2A, 2M en 2N. Het is niet geschikt bij type 2B. Bij deze mensen veroorzaakt DDAVP een tekort aan bloedplaatjes. Ook wanneer je zelf te weinig factor 8 aanmaakt, heeft DDAVP geen effect. Bij type 3 is dit vaak het geval.

3. **Tranexaminezuur**

Tranexaminezuur voorkomt dat bloedstolsels te snel oplossen. Het beschadigde bloedvat krijgt zo beter de kans om te genezen. Het middel werkt vooral goed bij slijmvliesbloedingen. Het wordt gebruikt bij de behandeling van een bloeding of uit voorzorg, bijvoorbeeld voor een operatie, tandheelkundige ingreep of tijdens de menstruatie bij hevig menstrueel bloedverlies.

Toediening: tabletten, mondspoeling of mondspoeling als drank.



NVHP

De NVHP is de patiëntenvereniging voor iedereen met een erfelijke stollingsstoornis. Heb je vragen of wil je in contact komen? We helpen je graag verder!

Scan de QR-code of ga naar www.nvhp.nl.

